

STUDII ȘI SINTEZE

C.Z.U.: 616.24-005.2:616-073.75(478)

DOI: <https://doi.org/10.52692/1857-0011.2024.2-79.02>

ROLUL EXAMINĂRILOR RADIOLOGICE ÎN DEPISTAREA PRECOCE A TUBERCULOZEI PULMONARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

respirator, documentația medicală, rezultatele investigațiilor clinico-diagnostice ale pacienților. A fost evaluată structura factorilor medico-sociali nefavorabili la 18223 persoane și apreciate criteriile identificării factorilor de risc sporit de îmbolnăvire cu tuberculoză care au fost supuse examenelor radiologice profilactice în teritoriile RM.

Rezultate.

A fost evaluată structura factorilor medico-social nefavorabili la 18223 persoane și apreciate criteriile identifi-cării factorilor de risc sporit de îmbolnăvire cu tuberculoză care au fost supuse examenelor radiologice profilactice în teritoriile RM (tabelul 1).

(86 – 0,5%), persoanele cu nivel igienico-sanitar necorespunzător (640 – 3,5%) au fost examinate în cadrul acestui screening.

În evoluția tuberculozei tot mai frecvent este menționat, că o importanță deosebită o au factorii sociali (3,7). Aceștia sunt persoanele social-

nefavorabile, migranții, muncitorii străini, șomerii ș.a., astfel în acest contingent au fost selectate 5808 persoane sau 31,9% din numărul total.

La identificarea grupelor de risc de populație

și în primul rând persoanele, care timp îndelungat nu au fost examinate radiologic, contingente de populație neorganizată, persoane angajate în muncă la întreprinderile și instituțiile mici. Conform rezultatelor selectării acestui contingent de populație au fost înregistrate 7255 persoane sau 39,8%.

La etapa pregătirii examenelor profilactice în teritorii o atenție deosebită a fost acordată identificării corecte a grupelor de risc crescut de îmbolnăvire, pe de o parte organizarea optimă ale activităților ținute asupra acestei categorii de populație să ne permită depistarea oportună la un număr însemnat de cazuri de tuberculoză, pe de altă parte examinările profilactice acestui contingent

Au fost analizate căile de depistare la 357 pacienți cu tuberculoză evolutivă, inclusiv 294 cazuri noi (82,4%) și 63 (17,6%) recidive, din ei au fost depistați prin adresare 181 sau 50,7%, cu scop profilactic prin examinarea grupelor de risc și vigilență sporită de

primordial de factorii medico-biologici, medico-sociali și social-economici. Astfel, cunoașterea factorilor de risc crescut de îmbolnăvire cu tuberculoză și a grupelor de populație expuse riscului ne-a permis să realizăm două obiective importante:

Tabelul 3

Concluzii.

Obiectivul principal al screening-ului este asigurarea depistării radiologice digitale “țintite” precoce din grupele cu risc sporit de îmbolnăvire cu tuberculoză pulmonară în anumite teritorii și colectivități cu potențial epidemiologic al tuberculozei crescut.

Unul dintre principiile-cheie ale screening-ului pentru TB este orientarea acestuia în mod corespunzător către grupurile cu risc sporit și adaptarea conform fiecărei situații specifice, în funcție de contextul epidemiologic, social.

Componența grupurilor cu risc sporit TB în teritoriile administrative examinate nu sunt constante și au fost supuse schimbărilor permanente,